



Dr Maria Willemsen
Dermatologie

Tel.02-270.34.80
Broekstraat 28
1860 St.-Brixius-Rode

www.dermatologiewillemsen.be
praktijk@dermatologiewillemsen.be

INTERACTIES MEDICATIES TEGEN SCHIMMELINFECTIES

Antischimmel medicaties kunnen het effect van andere medicaties versterken. Best is dat u dit toch eens nagaat, eventueel met uw huisarts.

ITRACONAZOLE

Itraconazole wordt vaak gedurende 1 week per maand genomen. U neemt bijvoorbeeld de eerste week van de maand gedurende 7 dagen 4 pillen per dag (ofwel 4 samen bij het ontbijt of 2 s' ochtend bij het ontbijt en 2 bij de warme maaltijd). Best is de medicatie in te nemen met een beetje boter of vet.

Er zijn weinig nevenwerkingen. Het medicament kan wat zwaar op de maag liggen. Uitzonderlijk kan u een veralgemeende huiduitslag ontwikkelen of een veralgemeende misselijkheid met bleke stoelgang en donkere urine. Best is dan dadelijk te stoppen en uw arts te contacteren.

Indien u Itraconazole neemt dient mag u sommige medicaties niet gebruiken.

Geneesmiddelen die absoluut niet mogen worden gebruikt tijdens behandeling met itraconazole zijn : Terfenadine, mizolastine, cisapride, triazolam, oraal midazolam, dofetilide, kinidine, pimozide, sommige vetverlagingsmiddelen waaronder simvastatine, atorvastatine en lovastatine.

Voor andere medicaties is voorzichtigheid vereist bij gelijktijdige toediening van itraconazole omdat itraconazole het effect van die medicaties kan versterken.

Soms is het nodig om de dosis van deze andere medicaties aan te passen. Soms is het nodig om ze even te staken tijdens de week waarin u itraconazole neemt (bijvoorbeeld stop van 3 dagen voor de inname tot 3 dagen erna)

Voorbeelden zijn :

- bloedverdunners (warfarine)
- medicaties om HIV te remmen, een antiviraal (Indavir R)
- bepaalde middelen gegeven bij kankers
- bloeddrukverlagende medicaties type Calciumantagonisten zoals

dihydropyridines en verapamil

- sommige kalmeermiddelen type benzodiazepine (triazolam, diazepam, alprozolam, brotizolam, midazolam)
- Bepaalde medicaties die de afweer verminderen: cyclosporine, tacrolimus en rapamycine
- Andere: digoxine, carbamazepine, buspirone, alfentanil, rifabutine en methylprednisolone, ebastine, reboxetine.

Tenslotte zijn er medicaties die de zuurtegraad in de maag remmen waardoor het medicament moeilijker wordt opgenomen : voorbeelden zijn Antiacida -H2 blokkers-protompompinhibitoren. Dit probleem kan opgelost worden, soms door inname van itraconazole in te nemen met een beetje cola of in andere gevallen door medicaties niet samen te nemen.

TERBINAFINE

Terbinafine neemt men s' ochtends in bij de maaltijd aan 1 co per dag.

Neveneffecten zijn meestal licht van aard. Het medicament kan wat misselijkheid geven, zwaar op de maag liggen, wat buikpijn of lichte diarree veroorzaken. Ernstige neveneffecten zijn zeldzaam. Beschreven werden allergische reacties met huiduitslag, geelzucht. Neem in deze gevallen dadelijk contact op en stop de medicatie. Ook smaakveranderingen kunnen voorkomen.

Interacties met andere medicaties zijn minder frequent. Ze komen voor bij volgende medicaties:

- tricyclische antidepressiva zoals clomipramine of amitriptyline-antidepressiva van het type selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's), b.v. paroxetine
- bepaalde geneesmiddelen van het type monoamine oxidase remmers, b.v. selegiline dat wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson
- betablokkers zoals metoprolol of carvedilol - mexiletine, flecainide en propafenon die worden gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen
- het antibacteriële geneesmiddel rifampicine
- het antimaagzweermiddel cimetidine
- orale anticonceptiva ('de pil') omdat onregelmatige menstruatiecycli of doorbraakbloedingen bij vrouwelijke patiënten kunnen optreden, is ze minder betrouwbaar.
- Andere geneesmiddelen: ciclosporine, terfenadine, triazolam

Bron : de officiële bijsluiters