



Dr Maria Willemsen
Dermatologie

Tel.02-270.34.80
Broekstraat 28
1860 St.-Brixius-Rode
www.dermatologiewillemsen.be
praktijk@dermatologiewillemsen.be

FINASTERIDE

Dit medicament wordt gebruikt bij prostaatvergroting. Het remt de omzetting van het mannelijke hormoon testosterone in een meer actieve vorm. Hierdoor gaat de omvang van de prostaat afnemen.

Finasteride remt ook de progressie van hormonaal gebonden haarverlies. Er zijn voldoende wetenschappelijke bewijzen dat dit werkt. In België is het medicament echter nog niet geregistreerd voor deze aandoening. Haarverlies staat dus ook niet op de bijsluiter. Voor het tegengaan van haarverlies wordt een lagere dosis voorgeschreven (1mg per dag bij de man, 2,5 mg bij de vrouw) dan de dosis die gebruikt wordt bij prostaatvergroting (5 mg per dag).

Voorzorgsmaatregelen

Bij de man

Finasteride kan een negatieve invloed hebben op de seksuele potentie en de kwaliteit van het zaad. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat er geen zwangerschap verwekt wordt. Ook mogen zwangere vrouwen niet blootgesteld worden aan zaad van patiënten die met finasteride behandeld worden. Om deze reden mogen vrouwelijke apothekers de pillen niet aanraken.

Finasteride kan de screening van prostaatvergroting bemoeilijken.

Bij de vrouw

Officieel is finasteride in België gecontraïndiceerd bij de vrouw. Nochtans kan het een gunstig effect hebben op sommige vormen van haarverlies. Vrouwen moeten in elk geval een goede anticonceptie gebruiken en geen borstvoeding geven.

Finasteride en neveneffecten?

Recent werden er bij mensen die langdurig finasteride namen depressies en persisterende seksuele dysfuncties beschreven. In andere studies wordt dit duidelijk tegengesproken. Wel is het zo dat u moet weten dat de neveneffecten van Finasteride nog niet volledig bekend zijn.

Patiëntenverklaring

Ik ondergetekende verklaar dat ik de informatiebrochure rond finasteride gelezen heb.

NAAM

HANDTEKENING

DATUM