



Dr Maria Willemsen
Dermatologie

Tel.02-270.34.80
Broekstraat 28
1860 St.-Brixius-Rode
www.dermatologiewillemsen.be
praktijk@dermatologiewillemsen.be

MEDICATIES VOOR HORMOON GEBONDEN HAARVERLIES BIJ VROUWEN

LOKAAL

Minoxidil 2%, (1 ml 2 keer /dag) of 5 % (1 ml dagelijks) op droge haren. Deze lotio veroorzaakt af en toe jeuk en schilfering op de schedel. U mag dan even stoppen en eventueel wat sneller contact opnemen met de arts.

IN TE NEMEN

ANTICONCEPTIEPIL: een type met een specifieke hormoon samenstelling.

ANDROCUR (Cyproterone acetaat)

Dagelijks Androcur 2-5mg/dag (na menopauze, bespreken met gynaecoloog)

OF

Cyclisch: Androcur 5-10mg gedurende 10 dagen per maand plus anticonceptiepil (voor menopauze)

SPIRONOLACTONE

Spironolactone is een anti- plaspil met anti-androgene eigenschappen. Ze dient steeds met contraceptie gecombineerd te worden. Mogelijke neveneffecten zijn menstruele onregelmatigheden, borstspanning, gemoedswisselingen, duizeligheid bij plots rechtstaan (=orthostatische hypotensie), meer plassen. Drink geen geconcentreerde drankjes met veel kalium (vb kokosmelk, sommige geconcentreerde fruitsappen).

Bij oudere patiënten of bij bepaalde onderliggende ziekten, wordt kalium getest voor start, na enkele maanden en bij dosisverhoging.

Er gebeurt ook af en toe een bloeddruk controle bij de huisarts.

Neem contact op bij duizeligheid.

FINASTERIDE

Bij lagere dosis werden geen complicaties gezien. Hoge dosis Finasteride (5mg) kan leiden tot gewichtstoename, libidoverlies, depressie.

Bij vrouwen wordt meestal 2.5 mg per dag voorgeschreven.

Finasteride is gecontra-indiceerd bij vrouwen met zwangerschapswens, in de zwangerschap en bij lactatie,

Strikte contraceptie is noodzakelijk.

Informed Consent (met uw handtekening) is nodig.

Neem contact op bij gemoedsverandering.

MEDICATIES VOOR HORMOON GEBONDEN HAARVERLIES BIJ MANNEN

LOKAAL

Minoxidil 5 % 1 ml 2 keer per dag op droge haren. Deze lotio geeft af en toe jeuk en schilfering op de schedel. U mag dan even stoppen en wat sneller contact opnemen met de arts.

IN TE NEMEN

FINASTERIDE

Bij mannen bedraagt de dosis 1 mg per dag. U kan de pillen (5 mg/ pil) zelf breken.

Mogelijke neveneffecten zijn verlaging van uw PSA waarde (marker voor prostaat) , libidoverlies, erectieproblemen, borstontwikkeling.

Finasteride is gecontra-indiceerd bij mannen met seksuele problemen en/of depressie.

Informed Consent (met uw handtekening) is nodig.

PSA waarde: te bepalen voor start Finasteride vanaf 40 jaar (het is belangrijk om uw basiswaarde te kennen)